

CIRUGÍA Y BY-PASS EXTRAANATÓMICO

Descripción del problema que Vd. presenta

La isquemia de las extremidades inferiores es una enfermedad que se caracteriza por la falta de circulación sanguínea en las piernas. Esto se debe a que las arterias que conducen la sangre presentan lesiones que las estrechan u obstruyen, manifestándose por la aparición de dolor en sus piernas al caminar, dolor en reposo, o la aparición de heridas o gangrena en sus pies.

Por otra parte, su estado general no permite la realización de intervenciones agresivas, que implicarían en usted un riesgo quirúrgico no asumible.

¿En que consiste la intervención?

En realizar un puente (by-pass) que lleve la sangre a la extremidad afectada de isquemia. En algunos casos precisa anestesia general.

Este by-pass se tuneliza por territorios poco profundos de su cuerpo, evitando una cirugía agresiva. Una vez realizada la intervención puede notar el trayecto del by-pass debajo de su piel.

Durante la operación pueden surgir situaciones inesperadas que pueden hacer variar el procedimiento previsto.

Objetivo y beneficios:

Mejorar la irrigación sanguínea de sus extremidades, disminuyendo el riesgo de amputación y eliminando el dolor en sus piernas.

Riesgos generales:

1. *De cualquier intervención:* Infección, hemorragia, alteraciones cardiológicas, respiratorias y/o renales, defectos de cicatrización y trombosis venosa profunda. Estas complicaciones se suelen resolver con tratamiento médico, aunque a veces es necesaria una nueva intervención quirúrgica. En algunos casos pueden tener consecuencias graves.
2. *Específicos del paciente:* Los pacientes con arteriosclerosis tienen un riesgo superior al de otros pacientes de padecer durante la intervención o el postoperatorio complicaciones cardiorrespiratorias, renales y cerebrales, con posibilidad de secuelas graves e incluso muerte. La obesidad y/o la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, bronquitis crónica, etc. son factores que agravan el riesgo de complicaciones durante la intervención y en los días siguientes (postoperatorio).

Riesgos específicos de la operación:

3. Trombosis del by-pass que puede implicar la reintervención y a veces la amputación de la extremidad.
4. Sangrado en algún punto de su by-pass.
5. Infección de sus heridas y/o del by-pass.
6. Si se realizan incisiones en sus ingles existe el riesgo de drenaje de líquido claro (linfa) durante algún tiempo.
7. Una vez realizada la intervención puede notar edema (hinchazón por acumulación de líquido) de la extremidad intervenida, que cederá progresivamente.

Alternativas:

Tratamiento analgésico paliativo en caso de que usted padezca dolor en reposo, que no le evita la amputación e incluso la muerte.

Tratamiento médico con vasodilatadores que puede mejorar de forma discreta su falta de circulación sin evitar, en la mayor parte de los casos, el riesgo de amputación.

Si usted, o algún familiar desea mayor información, no dude en consultar a cualquiera de los médicos del Servicio que le atienden.

RIESGOS PERSONALIZADOS (si procede, aparte de los referidos en el apartado 2 de riesgos generales):
