



Protocolo TRANSTEC. Dolor en Cirugía Vascolar

Nombre:

Nº.Hª:

Edad:

1.- Antecedentes personales

HTA Diabetes Cardiopatía EPOC Neo

2.- Dolor de origen vascular:

SIC gº III SIC gº IV Úlcera venosa Úlcera HTA Úlcera mixta

3.- Tiempo de evolución del dolor: días

4.- Tto. previo:

Ninguno AINE Paracetamol / nolotil Tramadol Opioides mayores

Tratamiento con TRANSTEC® parche transdérmico

/ /	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/> 35 µgrs.	X														
<input type="checkbox"/> 55,5 µgrs.															
<input type="checkbox"/> 70 µgrs.															
Analgesia extra	3 3 3														

1. Nolotil 2. Paracetamol 3. Adolonta 4. Cloruro mórfico

Escala dolor															
Efectos 2º (A)															
Tto. Efectos 2º															
Fin del tto. (B)															

(A) 1. Nauseas / vómitos 2. Mareo 3. Cefalea 4. Sedación 5. Estreñimiento 6. Insomnio 7. Temblor
8. Dermatitis 9. ...

(B) 1. Efecto adverso grave 2. Intervención 3. Exitus 4. Alta

NOTAS